

Procedure Service GASTROPANEL®

PRINCIPIO

Il GastroPanel® è un semplice esame del sangue che può essere utilizzato per valutare lo stato della mucosa gastrica, compresa la produzione di acido gastrico. Non solo identifica l'infezione da Helicobacter Pylori, ma indica anche se ci sono modifiche della mucosa suggerendo la presenza di un'infiammazione cronica.

PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER

- 1. IDENTIFICARE I PAZIENTI CON MUCOSA GASTRICA SANA;
- 2. IDENTIFICARE I PAZIENTI CHE RICHIEDONO UNA GASTROSCOPIA;
- 3. IDENTIFICARE I PAZIENTI CON ACLORIDRIA E IPOCLORIDRIA;
- 4. DIAGNOSTICARE L'INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI;
- 5. DIAGNOSTICARE LA GASTRITE ATROFICA.

METTE IN EVIDENZA I SEGUENTI RISCHI

- 1. CARENZA DI VITAMINA B12 E DI MICRONUTRIENTI;
- 2. ULCERA PEPTICA E DUODENALE;
- 3. CANCRO GASTRICO.

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

Il paziente non dovrebbe bere, mangiare o fumare per almeno 4 ore (oppure per 10 ore equivalente al digiuno notturno che è preferibile) prima della raccolta del campione. Il paziente può assumere i farmaci regolarmente prescritti, tranne i seguenti medicinali che hanno effetti sulla secrezione gastrica.

Una settimana prima della raccolta del campione: ranitidina (Esophex , Dentro Brus , Ranicur, Ranil, Ranimex, Ranitidin, ranitidina, Ranixal, Zantac), famotidina (Famotidin , Pepcid , Pepcidin, Pepcid Duo) , nizsdine (Nizax), inibitori della pompa protonica quali lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo, rabeprazolo ecc (Lansoprazolo, Lansoprazolo, Lanzo, Zolt, Losec, Omeprazolo, Nexium, Pariet, Somac, Gasterix, Pantoloc, Giasemin, Panzor).

Un giorno prima della raccolta del campione: farmaci che neutralizzano la secrezione acida gastrica quali antiacidi (Balancid Novum, Gaviscon, Link, Latte di magnesio, Novaluzid, Rennie) ed i protettori della mucosa gastrica (Alsucral, Antepsin).

Il paziente deve consultare il proprio medico riguardo all'interruzione dei farmaci. Nel caso in cui l'assunzione dei farmaci non possa essere sospesa, il paziente deve informare la persona che sta eseguendo il prelievo sulla tipologia dei medicinali assunti.

