



Isteroscopia / Colposcopia

ISTEROSCOPIA

L'isteroscopia è un esame diagnostico di primo livello che consente di vedere all'interno della cavità uterina, ed è utile soprattutto per studiare la mucosa endometriale nelle varie fasi del ciclo mestruale e per lo studio della sterilità/infertilità.

L'esame può essere eseguito entro il 10° giorno dopo il ciclo mestruale, in alternativa è possibile eseguirlo anche in un altro periodo esibendo una beta negativa.

Non è prevista la visita preliminare ma sono richiesti in visione, esami che non devono essere più vecchi di un mese, quali:

- ✓ TAMPONE VAGINALE
- ✓ HBsAg (Hepatitis B surface antigen) valutazione delle infezioni da virus dell'epatite B
- ✓ HCV (Hepatitis C Virus) valutazione delle infezioni da virus dell'epatite C

COLPOSCOPIA

La colposcopia è un esame di secondo livello, che costituisce un approfondimento richiesto dal ginecologo quando i risultati del pap test mostrano delle alterazioni delle cellule esaminate che facciano sospettare una infezione (es. da virus HPV), una lesione pre-tumorale o tumorale del collo dell'utero.

L'esame può essere eseguito anche in gravidanza.

Non è prevista la visita preliminare ma per eseguire l'esame è richiesto in visione soltanto un thin-prep / pap-test non più vecchio di 1 mese.

PREPARAZIONE E ASSUNZIONE FARMACI

Gli esami sono eseguiti in ambulatorio e non richiedono né il digiuno né alcun tipo di anestesia o preparazione farmacologica.

Gli antibiotici vengono utilizzati come profilassi solo nelle pazienti portatrici di valvulopatie cardiache.

Si possono continuare ad assumere regolarmente i farmaci con i quali si è eventualmente in terapia, avendo solo cura di avvisare alla prenotazione dell'esame se si fa uso di anticoagulanti o di aspirinetta.